

# AIRESSA® - COMPUESTA DUAL

## Cápsulas

**FÓRMULA:**Cada Cápsula contiene:

Bromuro de Clidinio ..... 5 mg  
Dimetilpolisiloxano Granular ..... 150 mg  
Excipientes c.s.

### INDICACIONES:

Tratamiento de úlcera péptica, alivia los espasmos, calambres abdominales o estomacales debido al dolor abdominal, cólico, diverticulitis y el síndrome del intestino irritable.

### CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los principios activos.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Tener precaución en pacientes con:

- Glaucoma.
- Antecedentes de depresión u otros problemas de salud mental.
- Antecedentes de problema de alcoholismo o drogadicción.
- Enfermedad renal.
- Enfermedad hepática.
- Dificultad para orinar.
- Embarazo.
- Lactancia.

### INTERACCIONES:

Puede causar mareos, somnolencia o visión borrosa. Si experimenta todos estos síntomas hay que tener cuidado al conducir, operar maquinaria o realizar actividades peligrosas.

Use alcohol con precaución. El alcohol puede aumentar la somnolencia y el mareo mientras toma clidinio.

Muchos otros medicamentos pueden aumentar los efectos secundarios del clidinio. Antes de tomar este medicamento, informe a su médico si está tomando alguno de los siguientes medicamentos:

- Amantadina.
- Quinidina.
- Antihistamínicos.
- Descongestionantes y supresores del apetito como fenilpropranolamina.
- Fenotiazinas tales como clorpromazina.
- Otras fenotiazinas usadas comúnmente, que

incluyen flufenazina, mesoridazina, perfenazina, tioridazina, trifluoperazina y promazina.

- Antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, doxepina y nortriptilina.
- Otros antidepresivos tricíclicos de uso común, que incluyen amoxapina, clomipramina, desipramina, imipramina, protriptilina y trimipramina.
- Puede aumentar el nivel de digoxina en su sangre.

### EFFECTOS SECUNDARIOS:

Estos efectos secundarios son posibles, pero no siempre se producen. Algunos de los efectos secundarios pueden ser poco frecuentes, consulte a su médico si observa alguno de los siguientes efectos secundarios, especialmente si no desaparecen.

- Mareo.
- Somnolencia.
- Debilidad.
- Visión borrosa.
- Ojos secos.
- Boca seca.
- Náusea.
- Estreñimiento.
- Distensión abdominal.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

#### DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Adultos: De 1 o 2 capsulas 3-4 veces por día, según la gravedad del caso.

En pacientes de edad avanzada o debilitados, comenzar con 1 o 2 cápsulas por día y después aumentar paulatinamente hasta alcanzar la dosis óptima.

Ingerir con un poco de líquido, con las comidas y al acostarse.

#### PRESENTACIÓN:

Dispensador x 100 Cápsulas.

Caja x 20 Cápsulas.

Cartera x 2 Cápsulas Muestra Médica.

#### RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta con Receta Médica

Producto Centroamericano Fabricado en El Salvador por  
Laboratorios FARDEL Propiedad de Guardado S.A. de C.V.

