

Fadoxidel

Cápsulas / Suspensión

FORMULA:

Cada cápsula contiene:

Cefadroxilo Monohidrato, equivalente a Cefadroxilo anhidro..... 500 mg
Excipientes c.s.

Cada 5ml de suspensión Reconstituida contiene:

Cefadroxilo Monohidrato, equivalente a Cefadroxilo anhidro.....250 mg
Excipientes c.s

INDICACIONES:

Cefadroxilo está indicado en el tratamiento de las siguientes infecciones cuando son causadas por microorganismos susceptibles.

Infecciones del aparato respiratorio: Amigdalitis, Faringitis, Bronquitis, Sinusitis, Otitis Media.

Infecciones de la piel o el tejido subcutáneo.

Infecciones del tracto genitourinario.

Infecciones de los huesos y articulaciones.

CONTRAINDICACIONES:

Pacientes con hipersensibilidad conocida al grupo de antibióticos Cefalosporínicos.

En pacientes alérgicos a la Penicilina, los antibióticos Cefalosporínicos deberán administrarse con gran cuidado.

PRECAUCIONES:

Utilizar el medicamento con precaución en pacientes con daño marcado en la función renal.

En individuos con historia de enfermedad gastrointestinal específicamente con colitis.

El uso de embarazo y lactancia, deberá usarse a criterio medico, solo en casos estrictamente necesarios.

Usar con precaución durante el periodo de lactancia.

DOSIS:

Cápsulas: De acuerdo a la patología del paciente.

Como Dosis se recomienda:

Infecciones del tracto urinario: 1 a 2 gramos al día en dosis única o dividida en dos.

Infecciones de la piel: 1 gramo por día en 1 dosis o en 2

Faringitis y Amigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A: 1 gramo al día en dosis única o dividida en dos dosis por lo menos durante 10 días.

Infecciones Respiratorias altas y bajas: para infecciones leves 1 gramo al día en dos dosis divididas de 500 mg cada una.

Para infecciones moderadas a severas, la dosis recomendada es de 1 a 2 gramos diariamente en dos dosis divididas.

Suspensión:

Niño con peso entre 10 a 40Kg: La dosis recomendada diariamente para niños, es de 25 a 50 mg/kg/día en dosis divididas (cada 12 horas).

En el tratamiento de infecciones por estreptococo beta hemolítico el tratamiento debe tener una duración de 10 días.

MODO DE PREPARACION:

Agítese el frasco para desprender el polvo contenido en el frasco luego agregue poco a poco agua hervida a temperatura ambiente hasta la marca de la flecha en la etiqueta del frasco, tapar y agitar hasta lograr la dispersión completa. Completar con agua hasta alcanzar nuevamente la marca de la etiqueta y volver agitar.

La suspensión preparada se conserva por 7 días a temperatura ambiente y 14 días en refrigeración.

VIA DE ADMINISTRACION:

Oral

PRESENTACION:

Cápsulas:

Dispensador x 100 Cápsulas.

Dispensador x 50 Cápsulas.

Caja x 30 Cápsulas.

Caja x 20 Cápsulas.

Caja x 10 Cápsulas.

Caja x 2 Cápsulas Muestra Médica.

Caja x 1 Cápsulas Muestra Médica.

Suspensión:

Caja con 1 Frasco x 100 mL Polvo para Suspensión.

Caja con 1 Frasco x 60 mL Polvo para Suspensión.

Caja con 1 Frasco x 30 mL Polvo para Suspensión Muestra Médica.

Caja con 1 Frasco x 20 mL Polvo para Suspensión Muestra Médica.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta con Receta Médica

Producto Fabricado por Wexford Laboratories Pvt. Ltd. India,
para **Laboratorios FARDEL**
Propiedad de Guardado S.A. de C.V.



**LABORATORIOS
FARDEL**
EL SALVADOR CENTROAMERICA