

# Farsolvan

## Cápsulas y Polvo para Suspensión

### FORMULA:

Cada cápsula contiene:

Amoxicilina Trihidrato,  
equivalente a Amoxicilina base ..... 500 mg  
Ambroxol HCl ..... 30 mg  
Excipientes, c.s.

Cada 5 mL de Suspensión Reconstituida contiene:

Amoxicilina Trihidrato,  
equivalente a Amoxicilina base ..... 250 mg  
Ambroxol HCl ..... 15 mg  
Excipientes, c.s.

### INDICACIONES:

Mucolítico y antibiótico para el tratamiento de las infecciones agudas o crónicas de las vías respiratorias, como bronquitis, sinusitis, otitis media causada por gérmenes sensibles a la amoxicilina. En todos los procesos infecciosos que cursen con retención de secreciones.

### CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad conocida a la amoxicilina, a otras penicilinas o al ambroxol. Administrar con precaución a pacientes con antecedentes ulcerosos gastroduodenales.

### EFFECTOS ADVERSOS:

Farsolvan es bien tolerado, aunque se puede presentar algunos malestares gastrointestinales y reacciones dermatológicas. En pacientes que se ha reportado una sensibilidad a las penicilinas, cefalosporinas y de otros alérgenos se debe evaluar y discontinuar la terapia con este producto.

**VIA DE ADMINISTRACION:** Oral.

### DOSIS:

#### Cápsulas:

Adultos y Niños mayores de 12 años: 1 cápsula cada 8 horas, pudiéndose administrar en caso de infecciones severas 2 cápsulas cada 8 horas.

#### Suspensión:

Adultos: 10 a 15mL, 3 veces al día; Niños: 5 a 10mL, 3 veces al día; Lactantes: 2.5 a 5mL, 3 veces al día. La administración debe mantenerse de 2 a 3 días después de la desaparición de los síntomas.

### MODO DE PREPARACION DE LA SUSPENSION:

Agítese el frasco para desprender el polvo contenido en el frasco, luego agregue poco a poco agua hervida a temperatura ambiente hasta la marca de la flecha en la etiqueta del frasco, tapar y agitar hasta lograr la dispersión completa. Completar con agua hasta alcanzar nuevamente la marca de la etiqueta y volver a agitar.

La suspensión preparada se conserva durante 7 días a temperatura ambiente no mayor de 30°C, y 14 días en refrigeración (2 a 8°C).

### AGITESE ANTES DE USARSE

### PRESENTACION:

#### Cápsulas:

Dispensador x 100 cápsulas.  
Caja x 2 cápsulas, Muestra Médica.

#### Polvo para Suspensión:

Caja con frasco x 100mL.  
Caja con frasco x 40mL, Muestra Médica.

### RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C.  
Manténgase fuera del alcance de los niños.

**Venta con Receta Médica**

Producto Centroamericano Fabricado en El Salvador por **Laboratorios FARDEL**.  
Propiedad de Guardado S.A. de C.V.

LABORATORIOS  
**FARDEL**  
EL SALVADOR CENTROAMERICA