

# Farxium Pylori

Tratamiento para Helicobacter Pylori

## ACCIÓN FARMACOLÓGICA:





La **Amoxicilina FD** es un antibiótico de amplio espectro, de excelente absorción por vía oral, de rápida respuesta clínica y buena tolerancia.

**Farxium** (Esomeprazol) es un inhibidor de la bomba de protones que suprime la secreción de ácido gástrico mediante la inhibición específica de la H<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>-ATPasa en la célula parietal gástrica.

**Levodol** (Levofloxacina) es un antibacteriano activo contra gérmenes gram-positivos y gram-negativos.

**Amoxicilina**

Se recomienda administrar 2 cápsula de Amoxicilina 500 mg 2 veces al día, durante 10 días.

Desayuno	Cena
 Amoxicilina 500 mg Tomar 2 cápsulas después del desayuno.	 Amoxicilina 500 mg Tomar 2 cápsulas después de la cena.
	




**Farxium**

Se recomienda administrar 1 cápsula de Farxium(Esomeprazol) 40 mg 2 veces al día, durante 10 días.

Desayuno	Cena
 Esomeprazol 40 mg Tomar 1 cápsulas 30 - 40 minutos antes del desayuno.	 Esomeprazol 40 mg Tomar 1 cápsulas 30 - 40 minutos antes de la cena.
	

**Levodol**

Se recomienda administrar 1 cápsula de Levodol(Levofloxacina) 500 mg 1 veces al día, durante 10 días.

Desayuno	
 Levofloxacina 500 mg Tomar 1 tableta recubierta durante el desayuno.	
	

\*La dosis pueden modificarse dependiendo de las indicaciones del médico.

## FORMULA:

Cada cápsula de Amoxicilina FD contiene:  
Amoxicilina Trihidrato (Equivalente a 500 mg de Amoxicilina Base) ..... 500 mg  
Excipientes c.s.

Cada cápsula de Farxium contiene:  
Esomeprazol Trihidrato Magnésico 184.05 mg equivalente a Esomeprazol ..... 40 mg  
Excipientes, c.s

Cada tableta recubierta de Levodol contiene:  
Levofloxacina hemihidrato, equivalente a Levofloxacina ..... 500 mg  
Excipientes c.s.

## INDICACIONES:

Tratamiento de infección gástrica por Helicobacter Pylori. El tratamiento conjunto de Farxium - Levodol - Amoxicilina FD se utiliza como tratamiento de rescate cuando han fracasado los esquemas convencionales.

## CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a cualquiera de los principios activos y demás componentes de la formulación.

## PRECAUCIONES:

En el caso de amoxicilina FD pueden producirse reacciones de hipersensibilidad igualmente que, con el resto de penicilinas, se debe determinar si el paciente tuvo reacciones alérgicas previas a cefalosporinas, cefamicinas y otra beta lactámicos por la posibilidad de reacciones cruzadas. En la lactancia los infantes podrían sensibilizarse si la madre recibe este medicamento. Pacientes con infecciones virales concomitantes, con leucemia o sarcoma y con insuficiencia renal y en casos de colitis ulcerosa o pseudomembranosa asociada a antibióticos.

Farxium debe ser utilizado con precaución en pacientes con deterioro de la función hepática. Antes de iniciar un tratamiento con Farxium debe descartarse la posibilidad de carcinoma gástrico, debido a que este fármaco puede enmascarar los síntomas y retrasar el diagnóstico.

Levodol en pacientes con epilepsia o con antecedentes de trastornos del SNC queda bajo supervisión del médico tratante por el riesgo de convulsiones. Se debe asegurar la correcta hidratación del paciente con objeto de prevenir la formación de cristales en la orina. Se recomienda que los pacientes eviten una excesiva exposición a la luz solar y si se produce

foto toxicidad, el tratamiento debe ser interrumpido. En caso de aparición de Rash cutáneo u otros signos de alergia, debe suspenderse la administración.

La administración en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y en pacientes mejores de 18 años queda a criterio del médico.

## EFFECTOS SECUNDARIOS:

En general los tres medicamentos son bien tolerados y las reacciones podrian ser cefaléa, diarrea, nauseas, vomito, flatulencia, estreñimiento, dolor abdominal y dispepsia.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

## DOSIS:

Las dosis habituales son:

**Amoxicilina FD 500 mg cápsula:** Administrar 2 cápsulas después del desayuno y 2 cápsulas después de la cena.

**Farxium 40 mg cápsula:** Administrar 1 cápsula 30 - 40 minutos antes del desayuno

y 1 cápsula 30 - 40 minutos antes de la cena.

**Levodol 500 mg Tableta Recubierta:** Administrar 1 tableta recubierta durante el desayuno.

## DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

10 días

## PRESENTACIONES:

Coempaque contiene los siguientes medicamentos:

**Cápsula de Amoxicilina FD 500 mg**

4 blister por 10 cápsulas (40 cápsulas).

**Cápsula de Farxium (Esomeprazol) 40 mg**

2 blister por 10 cápsulas (20 cápsulas).

**Tableta Recubierta de Levodol (Levofloxacina) 500 mg**

1 blister por 10 tabletas recubiertas.

## Venta con Receta Médica

Producto Centroamericano fabricado en El Salvador  
por **Laboratorio Fardel**

