

Flucodel

Cápsulas

FORMULA:

Cada cápsula contiene:
Fluconazol 200 mg
Excipientes, c.s.

INDICACIONES:

- Criptococosis.
- Candidiasis sistémica.
- Candidiasis genitales, vaginal aguda o recurrente.
- Profilaxis para reducir la incidencia de la Candidiasis vaginal recurrente.
- Profilaxis de infecciones por hongos en pacientes que se les administra tratamiento citotóxico o radioterapia.
- Dermatomicosis profundas en pacientes inmunocomprometidos, coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis.

CONTRAINDICACIONES: No utilizar en pacientes con hipersensibilidad conocida al medicamento. La administración concomitante con Terfenadina está contraindicada, en pacientes que se les administran dosis múltiples de 400 mg o mayores por día. Contraindicada a pacientes en tratamiento con Cisaprida, simultáneo con este medicamento.

RESTRICCIONES DE USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA: Deberá evitarse su administración durante el embarazo y la lactancia. En pacientes con infecciones micóticas severas será el médico que evalúe el riesgo beneficio obtenido con la administración del medicamento.

PRECAUCIONES: Fluconazol ha sido asociado con raros casos de toxicidad hepática severa, en pacientes con condiciones médicas de gravedad. En casos raros pueden desarrollarse reacciones cutáneas exfoliativas, como síndrome de Steven-Johnson y necrólisis tóxica epidérmica. Los pacientes con SIDA son los más propensos a desarrollar este tipo de reacciones.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Fluconazol es generalmente bien tolerado, los efectos secundarios conocidos son a nivel del sistema nervioso central y periférico, cefaleas.

Gastrointestinales: diarreas, dolor abdominal, náuseas, flatulencias.

Hígado y vías biliares: toxicidad hepática.

Piel anexo: alopecia.

Alteraciones cutáneas exfoliativas. Alteraciones del gusto

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Interactúa con administración simultánea de: anticoagulantes, benzodiazepinas, cisaprida, hidroclorotiazidas, fenitoina.

VIA DE ADMINISTRACION: Oral.

DOSIS: La dosis de administración deberá basarse de acuerdo al cuadro clínico por lo que será el médico quien deberá especificarla.

PRESENTACION:

Dispensador x 100 Cápsulas.

Dispensador x 50 Cápsulas.

Caja x 30 Cápsulas.

Caja x 20 Cápsulas.

Caja x 10 Cápsulas.

Caja x 2 Cápsula.

Caja x 1 Cápsula.

Caja x 2 Cápsulas Muestra Médica.

Caja x 1 Cápsula Muestra Médica.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta con Receta Médica

Producto Centroamericano Fabricado en El Salvador por
Laboratorios FARDEL

