

GLUCOLESS

Tabletas Recubiertas

Fardel
Health

FORMULA: Cada Tableta Recubierta contiene:

Fosfato de Sitagliptina monohidratado eq. a

Sitagliptina 50 mg

Metformina HCl 1000 mg

Excipientes, c.s.

INDICACIONES:

En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, como complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control de la glucemia, cuando no es controlada suficientemente con monoterapia de metformina o sitagliptina. La sitagliptina / metformina es un inhibidor de la dipeptidil peptidasa - 4 (DPP-4) y la combinación de las biguanidas. Funciona mediante el aumento de la liberación de insulina. Disminuye la cantidad de azúcar que produce el hígado y los intestinos absorben. También ayuda a hacer que su cuerpo sea más sensible a la insulina que usted produce de forma natural.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a la metformina o sitagliptina. Cetoacidosis diabética y pre-coma diabético. Insuficiencia renal moderada y grave (aclaramiento de creatinina <60 mL/min). La condiciones agudas con el potencial de alterar la función renal como la deshidratación, infección grave, shock. La administración intravascular de agentes de contraste yodados. La enfermedad aguda o crónica que puede causar hipoxia tisular, como insuficiencia cardíaca o respiratoria, infarto de miocardio reciente, shock, insuficiencia hepática, intoxicación alcohólica aguda, alcoholismo, lactancia.

EFFECTOS SECUNDARIOS: Cuando se usa Glucoless con o sin insulina, puede ocurrir bajo nivel de azúcar en sangre (hipoglucemia). Los signos y síntomas de la hipoglucemia puede incluir dolor de cabeza, somnolencia, debilidad, mareo, confusión, irritabilidad, hambre, ritmo cardíaco acelerado, sudoración y sensación de nerviosismo. Hable con su médico o farmacéutico cómo tratar niveles bajos de azúcar en la sangre.

VIA DE ADMINISTRACION: Oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Tomar dos veces al día con las comidas. Cuando se utiliza en combinación con una sulfonilurea, o con insulina una dosis menor de la sulfonilurea o insulina puede ser necesaria para reducir el riesgo de hipoglucemia. Los pacientes con insuficiencia renal: no deben utilizarse en pacientes con insuficiencia renal moderada o grave (aclaramiento de creatinina <60 ml/min). Los pacientes con insuficiencia hepática: no se pueden usar. Personas de edad avanzada: utilizar con precaución de la acidosis láctica asociada a la metformina. Se debe tener cuidado en pacientes mayores de 75 años de edad debido a los datos limitados de seguridad en esta población. Niños: No recomendada menores de 18 años de edad.

PRESENTACION:

Caja x 30 Tabletas recubiertas, Caja x 28 Tabletas recubiertas, Caja x 15 Tabletas recubiertas,

Caja x 14 Tabletas recubiertas, Caja x 7 Tabletas recubiertas.

Caja x 10 Tabletas recubiertas, Muestra Médica. Caja x 5 Tabletas recubiertas, Muestra Médica.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta con Receta Médica

Producto Centroamericano Fabricado en El Salvador

por **Laboratorios FARDEL**

Propiedad de Guardado S.A. de C.V..

LABORATORIOS
FARDEL
EL SALVADOR CENTROAMERICA