

Gyno-Imidalyln

Nitrato de Miconazole 2%

Crema Vaginal Fungicida

FORMULA:

Cada 100g contienen:
Nitrato de Miconazole 2g
Excipientes, c. s.

INDICACIONES:

Gyno-Imidalyln está indicado para el tratamiento local de vulvo-vaginitis causada por *Candida* sp. y otros patógenos como bacterias y cocos gram-positivos.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al medicamento.

PRECAUCIONES:

Gyno-Imidalyln administrado por vía vaginal es absorbido sistémicamente en pequeñas cantidades, por lo que se recomienda administrar en los primeros 3 meses del embarazo sólo bajo indicación facultativa.

VIA DE ADMINISTRACION: Tópica-vaginal.

DOSIS:

Aplicar una vez al día antes de acostarse, introduciendo el aplicador lleno profundamente en la vagina. El aplicador puede contener aproximadamente 5 gramos de crema. La dosis se repite durante 2 semanas, incluso si desaparecen los síntomas.

Debe cumplirse el ciclo completo del tratamiento.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

1. Perforar la boca del tubo.
2. Enroscar el aplicador en la boca del tubo.
3. Apretar el tubo y llenar el aplicador con Gyno-Imidalyln.
4. Retirar el aplicador del tubo. Tapar el tubo inmediatamente.
5. Acostarse manteniendo las piernas separadas; en esta posición introducir el aplicador en la vagina lo más profundamente posible. Apretar el émbolo, para introducir de esta forma la crema en la vagina.
6. Después de haber depositado en la vagina toda la crema contenida en el aplicador, retirar y descartarlo.

PRESENTACIONES:

Caja con tubo conteniendo 40 g de crema y 7 aplicadores.
Caja con tubo conteniendo 70 g de crema y 14 aplicadores.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta sin Receta Médica

Producto Fabricado en El Salvador por **Laboratorios FARDEL**
Propiedad de Guardado S.A. de C.V

