

Ibudel A-R

Tabletas

FORMULA:

Cada tableta contiene:

Meloxicam..... 7.5mg

Excipientes c.s.

INDICACIONES:

Tratamiento de artritis, tratamiento de artrosis, tratamiento de enfermedades reumáticas en estados agudos o crónicos: artritis reumatoidea, osteoartritis (enfermedad articular degenerativa).

CONTRAINDICACIONES:

En personas con hipersensibilidad al meloxicam. Existe un riesgo de sensibilidad cruzada con el ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no esteroideos, por lo que no puede ser usado en pacientes en los que la administración previa de dichos fármacos han dado lugar a manifestaciones de asma, angiodema o urticaria.

PRECAUCIONES:

No es recomendado su uso en mujeres embarazadas, en período de lactancia ni en niños menores de 12 años.

REACCIONES Y ADVERTENCIAS:

Ocasionalmente puede provocar dispepsia, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, flatulencia, estreñimiento, prurito y rash, cefalea, mareo.

INTERACCIONES:

La coadministración de otros antiinflamatorios no esteroideos incluyendo ácido acetilsalicílico en altas dosis puede aumentar el riesgo de úlcera gastrointestinales y sangrado a través de una acción sinérgica. Ibudel AR puede producir eventualmente reacciones de hipersensibilidad cruzada con ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios no esteroideos.

VIA DE ADMINISTRACION: Oral.

DOSIS:

Adultos y niños mayores de 12 años: 2 tabletas una vez al día o según prescripción médica.

PRESENTACION:

Dispensador x 100 Tabletas.

Dispensador x 50 Tabletas.

Caja x 21 Tabletas.

Caja x 20 Tabletas.

Caja x 2 Tabletas Muestra Médica.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta con Receta Médica

Producto Centroamericano Fabricado en El Salvador por
Laboratorios FARDEL para José B. Guardado Orellana

LABORATORIOS
FARDEL
EL SALVADOR CENTROAMERICA