

Imidalyln

Nitrato de Miconazole 2%
Fungicida

Crema

FORMULA: Cada 100 gramos contienen:

Nitrato de Miconazole..... 2g

Excipientes, c. s.

INDICACIONES:

Infecciones de la piel y de las uñas debidas a los dermatofitos, levaduras y otros hongos, como: Tinea corporis, capitis, manuum, pedis (pie de atleta), barbae, cruris. Tinea unguim. Pitiriasis versicolor. Estomatitis angularis. Candidiasis de la piel y de las uñas. Micosis post antibioticoterapia. Infecciones y sobre infecciones por bacterias grampositivas. Candidiasis anal, vulvar y escrotal en niños y prematuros.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad conocida al miconazol o algún otro componente del grupo de los imidazoles.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Sólo para uso externo. No debe aplicarse en la conjuntiva ocular.

No se use simultáneamente con otro antimicótico de uso tópico, para evitar el riesgo de resistencia al fármaco.

Debe evitarse su uso durante el primer trimestre del embarazo fundamentalmente.

EFFECTOS ADVERSOS:

El miconazol crema es generalmente bien tolerado. Han sido reportado casos aislados de irritación o sensación de ardor, después de su aplicación. En personas hipersensibles puede aparecer dermatitis por contacto.

DOSIS

Adultos y niños:

Infecciones cutáneas: Aplicar en pequeñas cantidades en la lesión 2 veces al día, extendiendo y frotando sobre la piel para que penetre. Prolongar el tratamiento durante 10 días más después de que hayan desaparecido las lesiones (lo que ocurre de ordinario de 3 a 5 semanas), con el fin de prevenir recaídas.

Micosis cutáneas (candidiasis, pitiriasis versicolor y dermatofitosis): Aplicar 1 o 2 veces al día.

Micosis de las uñas: Corte las uñas infectadas lo más que sea posible, aplique un poco de crema 1 vez al día, recubriéndola con esparadrapo no perforado 24 horas. Espere la caída de la uña y continúe el tratamiento hasta que crezca la uña nueva y se observe la curación definitiva (el proceso dura de 2 a 7 meses o más).

VIA DE ADMINISTRACION: Tópico.

PRESENTACIONES:

Caja con tubo conteniendo 25 g de crema.

Caja con tubo conteniendo 10 g de crema Muestra Médica.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta sin Receta Médica

Producto Centroamericano Fabricado en El Salvador por **Laboratorios FARDEL**
Propiedad de Guardado S.A. de C.V.

