

Intestocort

Suspensión

COMPOSICION:

Cada 5 mL de Suspensión contiene:

Dihidroestreptomicina Sulfato	100 mg
Sulfaguanidina	500 mg
Caolín Coloidal	1 g
Pectina Cítrica	30 mg
Vehículo, c.s.	

INDICACIONES:

Intestocort está indicado en casos de enteritis, colitis, diarreas infecciosas, diarreas infecciosas, diarreas no específicas, disentería bacilar.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

PRECAUCION:

No administrar a personas alérgicas a la tartrazina.

VIA DE ADMINISTRACION: Oral.

DOSIS:

Niños: 1/2 a 1 Cucharadita cada 4 horas.

Adultos: 1 a 2 Cucharadas cada 4 horas.

AGITASE ANTES DE USARSE

PRESENTACION:

Caja con frasco x 60 mL

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta con Receta Médica

Producto Centroamericano Fabricado en El Salvador por

Laboratorios FARDEL

Propiedad de Guardado S.A. de C.V.

