

# Levodel - Levodel Plus

## Tabletas Recubiertas

### FORMULA:

Cada Tableta Recubierta de Levodel contiene:  
Levofloxacin hemihidrato equivalente a  
Levofloxacin base ..... 500 mg  
Excipientes, c.s.

Cada Tableta Recubierta de Levodel Plus contiene:  
Levofloxacin hemihidrato equivalente a  
Levofloxacin base ..... 750 mg  
Excipientes, c.s.

### INDICACIONES:

En el tratamiento de infecciones del trato respiratorio superior e inferior, incluyendo sinusitis, exacerbación aguda de bronquitis crónica y neumonías adquiridas en la comunidad. Infecciones del tracto genitourinario y gastrointestinal.

### CONTRAINDICACIONES:

Está contraindicada en pacientes hipersensibles a las quinolonas. Se han descrito serios efectos secundarios y reacciones anafilácticas incluso después de la primera dosis de levofloxacin. Debe discontinuarse si aparece algún síntoma de hipersensibilidad tal como eflorescencia de la piel (rash). Contraindicado en embarazo, lactancia, niños y adolescentes, excepto cuando los beneficios superen claramente los riesgos posibles.

### ADVERTENCIAS:

Las quinolonas han sido asociadas a la ruptura de tendones, por lo que debe discontinuarse la levofloxacin si se desarrolla dolor tendinoso. Úsese con precaución en síndrome convulsivo.

**INTERACCIONES:** La administración concurrente de tabletas de LEVODEL y LEVODEL PLUS con antiácidos conteniendo calcio, magnesio o aluminio, así como también sacarato, cationes metálicos tales como hierro y preparaciones de multivitaminas con zinc pueden interferir con la absorción gastrointestinal de LEVODEL y LEVODEL PLUS. Al igual que otras quinolonas, la administración concomitante de LEVODEL y LEVODEL PLUS puede prolongar la vida media de teofilina, elevar los niveles séricos de teofilina, e incrementar el riesgo de reacciones adversas relacionadas a la teofilina. La administración concomitante de LEVODEL y LEVODEL PLUS con warfarina, digoxina y ciclosporina no requieren modificaciones en la dosis de uno u otro compuesto. Sin embargo, el tiempo de protrombina y niveles de digoxina pueden ser estrechamente monitoreados en pacientes que reciben terapia concomitante con warfarina o digoxina respectivamente. LEVODEL y LEVODEL PLUS se puede administrar con seguridad a individuos que reciben concomitantemente terapia con probenecid o cimetidina, ambos disminuyen la depuración y prolongan la vida media de LEVODEL y LEVODEL PLUS, siempre y cuando la dosis de LEVODEL y LEVODEL PLUS sea ajustada apropiadamente basada en la función renal del paciente. La administración concomitante de fármacos antiinflamatorios no esteroideos con una quinolona, incluyendo LEVODEL y LEVODEL PLUS, pueden incrementar el riesgo de estimulación del SNC y crisis convulsivas. Se han reportado alteraciones en la glucosa sanguínea, incluyendo hiperglucemia e hipoglucemia en pacientes tratados concomitantemente con quinolonas y agentes antiadibéticos. Por lo tanto, se recomienda monitoreo cuidadoso de la glucosa sanguínea cuando estos agentes son co-administrados. La absorción de LEVODEL y LEVODEL PLUS y disposición en sujetos HIV-infectados con o sin tratamiento concomitante con zidovudina fueron similares. Por lo tanto, no se ajusta la dosis para LEVODEL y LEVODEL PLUS al ser requerida cuando se coadministra con zidovudina. El efecto de LEVODEL y LEVODEL PLUS en la farmacocinética de zidovudina no se ha estudiado.

### PRECAUCIONES:

No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas, podría ser usado durante el embarazo solo si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial al feto. No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños y adolescentes en etapa de crecimiento.

### REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:

Es generalmente bien tolerado. Los eventos adversos más comunes fueron: diarrea, náuseas y vaginitis.

### VIA DE ADMINISTRACION:

Oral.

### DOSIS:

**Mayores de 18 años:** La dosis usual en pacientes con función renal normal es de 500 mg y 750 mg al día, respectivamente, durante un total de 7 a 14 días, según la gravedad y características de la infección.

### PRESENTACION:

#### Levodel:

Caja x 10 Tabletas Recubiertas.  
Caja x 7 Tabletas Recubiertas.  
Caja x 5 Tabletas Recubiertas.  
Caja x 2 Tabletas Recubiertas.  
Caja x 1 Tableta Recubierta.  
Caja x 1 Tableta Recubierta Muestra Médica.

#### Levodel Plus:

Dispensador x 100 Tabletas Recubiertas.  
Caja x 10 Tabletas Recubiertas.  
Caja x 7 Tabletas Recubiertas.  
Caja x 5 Tabletas Recubiertas.  
Caja x 2 Tabletas Recubiertas.  
Caja x 1 Tabletas Recubiertas Muestra Médica.

### RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta con Receta Médica

Producto Centroamericano Fabricado en El Salvador por  
Laboratorios FARDEL. Propiedad de Guardado S.A. de C.V.



LABORATORIOS  
**FARDEL**  
EL SALVADOR CENTROAMERICA