

Motidel Gas

Suspensión

FÓRMULA: Cada mL contiene:
Dimetilpolisiloxano 100 mg
Vehículo, c.s.

INDICACIONES:

Alivio sintomático de los gases en adultos, niños y lactantes.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al principio activo. Perforación y obstrucción intestinal conocida o sospechada.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Si los síntomas persisten o si empeoran, o en caso de estreñimiento prolongado, consultar a su médico. Este producto no está recomendado para el tratamiento de los cólicos del lactante debido a la limitada información disponible..

REACCIONES SECUNDARIAS:

El dimetilpolisiloxano es atóxico y no se han reportado efectos secundarios.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

DOSIS:

Adultos y adolescentes

La dosis recomendada es 100 mg (20 gotas o 1 mL) tres veces al día después de cada una de las principales comidas.

No administrar más de 500 mg (100 gotas o 5 mL) al día.

Población pediátrica

Niños menores de 2 años: 20 mg (4 gotas o 0.2 mL) 3 veces al día administrados con el biberón o con otro alimento o líquido. No administrar más de 200 mg (40 gotas o 2 mL) al día.

Niños de 2 a 12 años: 40 mg (8 gotas o 0.4 mL) 3 veces al día.

No administrar más de 200 mg (40 gotas o 2 mL) al día.

Puede administrarse solo o diluido en cualquier líquido.

AGITESE ANTES DE USARSE

PRESENTACIÓN:

Caja x 1 frasco gotero x 15 mL.

Caja x 1 frasco gotero x 12 mL Muestra Médica.

Caja x 1 frasco gotero x 10 mL Muestra Médica.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta sin Receta Médica

Producto Centroamericano Fabricado en El Salvador por
Laboratorios FARDEL. Propiedad de Guardado S.A. de C.V.

FARDEL