

Previnex

Tabletas

FORMULA:

Cada tableta contiene:
Ivermectina 6 mg
Excipientes c.s

INDICACIONES.

Está indicado para el tratamiento de enfermedades parasitarias, oncocercosis, estrogiloidiasis, escabiosis (sarna) humana.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Embarazo y lactancia. Niños menores de 5 años, la seguridad del empleo antes de esa edad no ha sido establecida.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

No se han establecido datos sobre eficacia y seguridad de ivermectina en inmunodeprimidos, tanto para el tratamiento de estrogiloidiasis intestinal como en su profilaxis.

Se desaconseja el tratamiento concomitante con Dietilcarbamina en pacientes con oncocercosis dados los rápidos efectos microfilaricidas de este fármaco y la posibilidad de reacciones cutáneas, sistémicas (reacción de Mazzotti) u oftalmológicas de diferente gravedad. Aunque el tratamiento de este tipo de reacciones no está bien establecido, se recomienda administración de sueroterapia IV en caso de hipotensión y/o corticoides parenterales en reacciones moderadas-graves. En las leves será suficiente con AINEs. Si se sospecha Loiasis concomitante tratarla previamente por riesgo de encefalopatía con el uso de este fármaco.

Algunas de las posibles reacciones adversas como mareo, somnolencia, vértigo y temblores pueden afectar a la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

INTERACCIONES.

Se excreta casi exclusivamente por las heces, menos del 1% en orina. De ahí su escasa capacidad de interacción.

Aumento del efecto anticoagulante si su administración es concomitante con warfarina. Monitorizar INR si uso concomitante con anticoagulantes orales.

Disminución del efecto terapéutico de la vacuna del bacilo Calmette-Guérin (BCG) y la vacuna de fiebre tifoidea viva atenuada (Ty21a), por lo que conviene evitar la administración simultánea.

EFFECTOS ADVERSOS.

En general, las reacciones adversas han sido leves y transitorias.

Para todas las indicaciones se han descrito en la fase post-comercialización: hipotensión, crisis asmática, temblores, hepatitis, necrólisis epidérmica tóxica y síndrome de Stevens Johnson, siendo estas últimas muy excepcionales.

Oncocercosis

Reacciones tipo Mazzotti (por la muerte del parásito): artralgia, adenopatías dolorosas, prurito, exantema papulo-pustular o urticarial, náuseas, vómitos, diarrea, vértigo e hipotensión y fiebre.

Oftalmológicos: edema palpebral, uveítis anterior, conjuntivitis, hemorragia conjuntival, limbitis, queratitis y coriorretinitis. Rara vez han sido graves y se resuelven la mayoría sin tratamiento.

Análitos: eosinofilia, y aumento de hemoglobina.

Filariasis linfática

Si amicrofilaremia: < 1% de reacciones adversas.

Si microfilaremia: fiebre, cefalea, mialgia, astenia, tos, anorexia, artralgia, diaforesis, odinofagia, mareo, epigastralgia, hipotensión, vértigo, dolor torácico, alteración de la función pulmonar, sensibilidad testicular, es rara la encefalopatía.

Análitos: eosinofilia, aumento transaminasas y hematuria.

Estrogiloidiasis intestinal

General: Astenia, dolor abdominal.

Gastrointestinal: Anorexia, estreñimiento, diarrea, náuseas y vómitos.

Sistema nervioso: Vértigo, somnolencia, temblores.

Análitos: anemia, leucopenia, aumento transaminasas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

DOSIS:

Oncocercosis y estrogiloidiasis:

Tomar una dosis única en ayunas, no se conoce la influencia de la alimentación sobre la absorción. La dosis puede ingerirse al levantarse o en otro momento, pero no se deben ingerir alimentos dos horas antes ni dos horas después de la ingestión de Ivermectina. No es necesario utilizar otras restricciones alimentarias o medicamentos complementarios. En la mayoría de los pacientes, el intervalo de tiempo propuesto es de 12 meses. Pero en ciertas regiones puede ser preferible repetir la administración cada seis meses, según la prevalencia o la densidad microfilariana cutánea.

Escabiosis:

La dosis recomendada es de una dosis única, de acuerdo con el peso del paciente. De ser necesario y según criterio médico, repetir la dosis a los 15 días. La importancia de la dosis está determinada por los pesos de los pacientes como a continuación se detalla:

Peso corporal (en Kg)	Dosis (en tabletas)
15-25	½
26-44	1
45-64	1 y ½
65-84	2

Alternativamente, en ausencia del peso de la persona, la dosis de ivermectina para utilización en campañas de tratamiento masivos puede ser determinada por la talla de los pacientes como se detalla a continuación:

Talla (en cm)	Dosis (en tabletas)
90-119	½
120-140	1
141-158	1 y ½
> 158	2

PRESENTACION:

Dispensador x 100 Tabletás.

Dispensador x 50 Tabletás.

Caja x 30 Tabletás

Caja x 24 Tabletás

Caja x 20 Tabletás

Caja x 15 Tabletás

Caja x 12 Tabletás

Caja x 10 Tabletás

Caja x 6 Tabletás

Caja x 1 Tableta muestra medica.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a una temperatura no mayor de 30 C.

Mantengase fuera del alcance de los niños

Venta con Receta Médica

Producto Centroamericano fabricado en El Salvador por **Laboratorio Fardel**

Propiedad de Guardado S.A. de C.V.

