



## Comprimidos Recubiertos

### FORMULA:

Cada Comprimido recubierto contiene:

Secnidazol ..... 166.66 mg

Itraconazol ..... 33.33 mg

Excipientes, c.s.

### INDICACIONES:

Es un antiinfeccioso ginecológico oral para el tratamiento de las vaginitis causadas por cualquier especie de *Candida* y *Trichomonas vaginalis* y vaginosis causadas por *Gardnerella vaginalis*, bacterias anaerobias y *Mobiluncus sp.*

### CONTRAINDICACIONES:

En pacientes con hipersensibilidad al compuesto o a sus excipientes. Dado que uno de los componentes de secnitral es un derivado imidazólico, está contraindicado en discrasia sanguínea y padecimientos del SNC.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

No debe administrarse durante el embarazo y lactancia.

No debe administrarse durante la segunda mitad del ciclo menstrual, a menos que se utilice un adecuado anticonceptivo o que la prueba para la detención del embarazo sea negativa.

### REACCIONES SECUNDARIAS:

Generalmente es bien tolerado, pero puede producir mal sabor de boca, náuseas, vómitos, pirosis, ardor epigástrico, gastralgias y vértigo. Estos efectos han sido de naturaleza leve y transitorio en todos los casos.

### VIA DE ADMINISTRACION: Oral.

### DOSIS:

Dos comprimidos recubiertos cada 12 horas, junto con los alimentos durante tres días.

### PRESENTACION:

Caja x 12 Comprimidos recubiertos.

Caja x 2 Comprimidos recubiertos Muestra Médica.

### RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

### Venta con Receta Médica

Producto Centroamericano Fabricado en El Salvador por  
**Laboratorios FARDEL**

