

Venalex

Tableta Recubierta

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 2 semanas.

Contenido del prospecto

1. Qué es Venalex y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Venalex
3. Cómo tomar Venalex
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Venalex
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Venalex y para qué se utiliza

Venalex es un medicamento venotónico: Aumenta el tono de las venas y la resistencia de los capilares (pequeños vasos sanguíneos).

Está indicado, en adultos, para el alivio de los síntomas relacionados con la insuficiencia venosa leve de las extremidades inferiores, tales como dolor, sensación de pesadez, tirantez, hormigueo y picor en piernas con varices o piernas hinchadas.

Debe consultar a un médico si empeora o no mejora después de 2 semanas de tratamiento.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Venalex

No tome Venalex:

Si es alérgico a los flavonoides o a alguno de los demás componentes de este medicamento.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Venalex.

No utilizar de forma prolongada sin control médico.

Niños y adolescentes

Venalex no está indicado en niños y adolescentes (menores de 18 años).

Toma de Venalex con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento. No se conocen interacciones con los alimentos ni con otros medicamentos, en todo caso nunca debe tomar otro medicamento por iniciativa propia sin que se lo haya recomendado su médico.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Embarazo

No se tiene constancia de ningún efecto nocivo en la especie humana. Se debe extremar la precaución en el uso de diosmina durante el embarazo, valorando adecuadamente el posible beneficio de este medicamento durante el mismo.

Lactancia

No se tiene constancia de si el medicamento pasa a la leche materna, se desaconseja su uso durante la lactancia.

Conducción y uso de máquinas

No se ha descrito ningún efecto sobre la capacidad de conducción y uso de máquinas con Venalex.

3. Cómo tomar Venalex

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.

Adultos:

La dosis recomendada es de 2 tabletas al día, repartidos en dos tomas, una

tableta al mediodía, y otra por la noche, con las comidas.

Si los síntomas no mejoran o empeoran en las primeras 2 semanas de tratamiento, debe consultar al médico.

Por indicación del médico se puede continuar el tratamiento con la misma dosis diaria (2 tabletas diarias) hasta 2-3 meses.

Si toma más Venalex del que debe

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o acuda al Hospital más cercano.

Si olvidó tomar Venalex

Es importante tomar este medicamento cada día. Sin embargo, si olvidó tomar una o más dosis de Venalex, tome otra tan pronto como se acuerde y después siga con el tratamiento prescrito.

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Estos efectos adversos incluyen:

- Frecuentes (menos de 1 de cada 10 pero más de 1 de cada 100): trastornos gastrointestinales (diarrea, indigestión, náuseas, vómitos).
- Poco Frecuentes (menos de 1 de cada 100 pero más de 1 de cada 1,000): colitis.
- Raros (menos de 1 de cada 1,000 pero más de 1 de cada 10,000): trastornos del sistema nervioso (mareos, dolor de cabeza, malestar) y reacciones cutáneas (erupción cutánea, prurito, urticaria).
- Frecuencia no conocida: dolor abdominal, edema aislado de la cara, labios y párpados (hinchazón). Excepcionalmente edema de Quincke (hinchazón rápida de tejidos tales como la cara, labios, boca, lengua o garganta que pueden causar dificultad para respirar).

Estos efectos adversos se han notificado sin necesidad de interrumpir el tratamiento.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

5. Conservación de Venalex

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Almacenar a temperatura no mayor a 30°C.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Venalex:

El principio activo es Diosmina (450 mg) y Hesperidina (50 mg).

Presentaciones:

Dispensador x 100 tabletas recubiertas.

Dispensador x 60 tabletas recubiertas.

Caja x 50 tabletas recubiertas.

Caja x 30 tabletas recubiertas.

Caja x 2 tabletas recubiertas (muestra médica).

Caja x 1 tableta recubierta (muestra médica).

Venta con Receta Médica

Producto Centroamericano Fabricado en Guatemala por Wellico Corporation S.A., para Laboratorios FARDEL

Propiedad de Guardado S.A. de C.V. El Salvador

