

Verolax

Tabletas

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su médico
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
- Debe consultar a un médico si empeora, si no se produce ninguna deposición después de 12 horas tras la toma máxima diaria, o si no mejora después de 6 días de tratamiento.

Contenido del prospecto:

1. Qué es VEROLAX TABLETAS y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar VEROLAX TABLETAS
3. Cómo tomar VEROLAX TABLETAS
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de VEROLAX TABLETAS
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es VEROLAX TABLETAS y para qué se utiliza

El principio activo de este medicamento, picosulfato de sodio, pertenece a un grupo de medicamentos denominados laxantes estimulantes.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar VEROLAX TABLETAS

Se recomienda beber diariamente de 6 a 8 vasos de líquido cuando se use cualquier tipo de laxantes para ayudar así a ablandar las heces.

No tome VEROLAX TABLETAS:

- Si es alérgico al picosulfato de sodio
- Si presenta síntomas tales como náuseas, vómitos, dolor abdominal intenso y/o fiebre, que puedan indicar la presencia de apendicitis u otros problemas abdominales.
- Si sufre de alguna enfermedad inflamatoria aguda intestinal, oclusión intestinal (ileo), perforación gastrointestinal, dolor abdominal intenso o no diagnosticado, deshidratación grave, o si observa sangre en heces.
- Si observa cambios repentinos en los hábitos intestinales (frecuencia y consistencia de las heces) que persisten más de 2 semanas.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico antes de empezar a tomar este medicamento

• Como todos los laxantes, este producto no debe tomarse de forma continuada a diario o durante períodos prolongados sin investigar la causa del estreñimiento. Su uso excesivo prolongado puede producir pérdida de agua y electrolitos (diarreas).

• Cuando se administra a personas de edad avanzada durante períodos prolongados, puede empeorar estados de cansancio y/o debilidad o producir una disminución de la tensión arterial y falta de coordinación de movimientos.

• Se han descrito casos de mareo y/o síncope en pacientes que han utilizado picosulfato de sodio. En base a la información disponible podrían deberse a un síncope por los esfuerzos durante la defecación o a una respuesta refleja al dolor abdominal relacionado con el estreñimiento y no necesariamente con el uso de picosulfato de sodio.

Niños

Contraindicado en niños menores de 12 años.

Otros medicamentos y VEROLAX TABLETAS

Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento.

El uso simultáneo de diuréticos (medicamentos utilizados para aumentar la eliminación de orina) o adreno-corticoides puede aumentar el riesgo de desequilibrio de los electrolitos si se toman dosis excesivas de Verolax tabletas.

Un desequilibrio de los electrolitos puede dar lugar a una sensibilidad aumentada de los glucósidos cardíacos (medicamentos utilizados para el corazón).

La administración simultánea de antibióticos puede reducir la acción laxante de Verolax tabletas.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

No se han realizado estudios sobre el efecto en la fertilidad en humanos.

Conducción y uso de máquinas

No existen estudios específicos sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar máquinas.

Durante el tratamiento con este medicamento se pueden producir mareos y/o síncope debido a una respuesta vasovagal (p. ej. a espasmos abdominales). Si tiene espasmos abdominales debe evitar tareas potencialmente peligrosas como conducir o manejar máquinas.

3. Cómo tomar VEROLAX TABLETAS

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico. En caso de duda pregunte a su médico.

La dosis recomendada es:

Adultos y niños mayores de 12 años: de 1 a 2 tabletas cada 24 horas en una sola toma. Se recomienda comenzar con la dosis más baja (1 tableta). La dosis puede ajustarse hasta llegar a la dosis máxima recomendada (2 tabletas) para lograr una evacuación regular.

No exceder de la dosis recomendada.

A dosis mucho más elevadas que las recomendadas, se han descrito casos de isquemia (disminución del riego sanguíneo) en la mucosa del colon.

Como todos los laxantes, el uso continuado de altas dosis de laxantes puede producir diarrea crónica, dolores abdominales, disminución de potasio en sangre, hiperaldosteronismo (producción excesiva de la hormona aldosterona por la glándula suprarrenal) secundario y cálculos renales (piedras en el riñón). Se han descrito también lesiones en el túbulo renal, alcalosis metabólica (aumento de la cantidad de bicarbonato en sangre) y debilidad muscular debida a la disminución del potasio sanguíneo.

Forma de administración:

Debe administrarse por vía oral.

Si toma más VEROLAX TABLETAS del que debe:

Podrían aparecer espasmos gastrointestinales, deposiciones mucosas y diarreas, pérdidas de líquido, potasio y otros electrolitos.

A dosis mucho más elevadas que las recomendadas, se han descrito casos de isquemia (disminución del riego sanguíneo) en la mucosa del colon.

Como todos los laxantes, el uso continuado de altas dosis de laxantes puede producir diarrea crónica, dolores abdominales, disminución de potasio en sangre, hiperaldosteronismo (producción excesiva de la hormona aldosterona por la glándula suprarrenal) secundario y cálculos renales (piedras en el riñón). Se han descrito también lesiones en el túbulo renal, alcalosis metabólica (aumento de la cantidad de bicarbonato en sangre) y debilidad muscular debida a la disminución del potasio sanguíneo.

Si olvidó tomar VEROLAX TABLETAS:

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, Verolax tabletas puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Efectos adversos muy frecuentes (pueden afectar al menos 1 de cada 10 pacientes):

- Diarrea.

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas):

- Cólicos.
- Dolor abdominal.
- Molestias abdominales.

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):

- Vómitos.
- Náuseas.
- Mareos.

Efectos adversos de frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

- Hipersensibilidad (reacciones alérgicas).
- Angioedema (inflamación que se produce bajo la superficie de la piel).
- Reacciones en la piel.
- Síncope.
- Erupciones en la piel.
- Hinchazón de la piel o de las mucosas (exantema).
- Picor.

Los mareos y síncope que aparecen después de la administración de Verolax tabletas parecen ser consecuentes con una respuesta vasovagal (p. ej. a un espasmo abdominal, defecación).

5. Conservación de VEROLAX TABLETAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

Almacenar a temperatura no mayor a 30°C.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición:

El principio activo es picosulfato de sodio. Cada tableta contiene 5 mg de picosulfato de sodio.

Presentaciones:

Dispensador x 200 Tabletás.

Caja x 20 Tabletás.

Caja x 2 Tabletás Muestra Médica.

Venta con Receta Médica

Producto Centroamericano Fabricado en El Salvador por Laboratorios FARDEL
Propiedad de Guardado S.A. de C.V.

